

## 주의사항

혹시라도 미심쩍은 부분이 있으면  
질문하십시오.

- 모든 약품은 아이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
- 복용 전에 약의 필요 여부를 확인합니다.
- 복용할 약의 용량이 알맞은지, 약의 강도가 적당한지 확인합니다.
- 약은 매 4 시간마다 복용하며, 24 시간내에 4 번이상 복용하는 일이 없어야 합니다.
- 보호자 이외의 다른 사람이 아이를 돌보았을 경우, 파라세타몰을 언제, 얼마만큼 먹였는지를 확인합니다.
- 파라세타몰이 함유된 다른 종류의 약도 함께 복용했는지 확인합니다.

## 약물 복용 기록표

아이 이름 \_\_\_\_\_

날짜 및 시간	몸무게 (kg)	약의 강도 120mg/5mL 250mg/5mL	일회 분량 (mL)

## 연락처

- 헬스라인 (Healthline)은 24시간 무료 건강 정보를 제공합니다. 연락처는 **0800 611 116** 입니다.
- 아이가 약물을 과다복용 했다면 의사나 간호사 혹은 약물중독센터로 즉시 연락하십시오. 연락처는 **0800 POISON (0800 764 766)** 입니다.

이 책자는 안내자료일 뿐 의사, 약사나 간호사의 조언을 대체할 수 없습니다.

To re-order e-mail [feedback@safex.co.nz](mailto:feedback@safex.co.nz)



(Paracetamol)  
파라세타몰을  
유아와 소아에게  
안전하게  
먹이는 방법

Giving Paracetamol Safely to Babies and Children (Korean)

파라세타몰을  
과다 복용하면  
위험합니다

## 파라세타몰은 무슨 약입니까?

통증을 완화하고 열이 있는 아이를

진정시키는 효과가 있습니다

- 졸립거나 잠들게 하는 약이 아닙니다
- 소아 및 생후 3개월 이상된 유아에게 먹이실 수 있습니다
- 3개월 미만의 유아의 경우 의사의 진단이 꼭 필요합니다

## 우리 아이에게 먹여도 될까요?

꼭 필요한 경우에만 복용하도록 합니다

- 고열이 있거나 (체온이 38.5도 이상), 아이 상태가 심각할때 사용하실 수 있습니다

## 얼마나 복용합니까?

용량은 아이의 체중과 파라세타몰의 강도에 맞춰 결정됩니다.

- 아이의 체중을 재어서 용량을 확인합니다
- 약품의 강도에 따라 두가지 종류가 있으니 꼭 확인합니다
- 약사, 의사나 간호사에게 문의하십시오

## 용량표

아이 몸무게 (kg)	120mg per 5mL	250mg per 5mL
5kg 이거나 그 이하	의사와 상의	의사와 상의
6.5kg	4mL	2mL
8kg	5mL	2.5mL
10kg	6mL	3mL
15kg	9mL	4.5mL
20kg	12mL	6mL
30kg	18mL	9mL
40kg	25mL	12mL

## 복용전 주의사항

다시 한번 아이의 상태를 확인해서 약의 필요 여부를 결정합니다

- 최소한 4시간 간격으로 복용합니다. 24시간 이내에 4번 이상 복용하지 않습니다
- 약 복용내역을 기록합니다. 다음 장의 초록색 도표에 기록하고 마지막으로 복용한 시점을 반드시 확인합니다

항상 복용량을 정확히 측정합니다

구강 주사기를 사용할 경우 약사나 간호사와 상의합니다

## 파라세타몰은 어디에 보관합니까?

아이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다

- 의약품 중독사고 중 가장 흔한 요인은 아이들이 이를 모르고 섭취한 경우입니다.
- 서늘한 곳에 보관하실 필요가 없습니다. 냉장고에 넣지 않습니다.
- 어린이 보호용 포장(안전캡)의 여부를 반드시 확인합니다 - 약사에게 문의하세요.

## 과다 복용시 응급 대처법은?

파라세타몰의 과다 복용으로 인해 아이의 간이 손상될 수 있습니다

- 아이가 약물을 과다 복용했다면, 의사나 간호사, 혹은 약물중독센터로 즉시 전화합니다. 연락처는 0800 764766 (0800 POISON)입니다.
- 약물의 과다 복용으로 인해 메스꺼움, 구토, 설사, 황달, 식욕부진, 사고의 혼란, 혹은 극도의 졸음증세가 나타날 수 있습니다.